

CÀNTERA

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

Noms FAO: es chopa fr dorade grise en black seabream

Sin. compl.: calet, càntara, xopa

Codi FAO: BRB

Fórmula radial: D. XI + 11-13; A. III + 9-11

Talla: màxima 60 cm; comuna de 20 a 30 cm.



Diagnosi

Cos oval, alt en el cas dels adults. Perfil del cap amb una depressió a nivell dels ulls; rostre curt, gattes amb escates; preopercle nu; boca inclinada; de 4 a 6 fileres de dents fines, punxegudes, en carda, a les dues mandíbules. De 22 a 25 branquispines sobre el primer arc branquial. Línia lateral que consta de 66 a 75 escates. Una sola aleta dorsal amb una part espinosa i una altra formada per radis tous. L'anal amb tres espines i radis tous; aquest radis tous de la dorsal i l'anal es troben en un solc escatós. Les pectorals, grans i falcades. Les ventrals toràciques amb una espina i cinc radis tous. Aleta caudal bifurcada. Color marronós o gris argentat amb tons blaus, verdosos o rosats i nombroses línies longitudinals de color marronós o daurat. El cap sol ser més obscur i l'aleta caudal està orlada de negre. A l'època de fresa, els mascles tenen una tonalitat general blau fosca o violeta intensa.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal sobre fons durs de roca i sorra; els adults es troben fins als 150 m; els joves fins als 50. Gregaris, sovint en bancs nombrosos. Omnívor, s'alimenta d'algues, peixos, crustacis i mol·luscs. La reproducció té lloc de febrer a maig. S'estén arreu de la Mediterrània, rarament a la mar Negra. A l'Atlàntic Oriental, des de Noruega, on és rara, fins a Angola, incloses les illes Madeira i Canàries.

Pesca

Espècie comercial de carn bastant apreciada. Es captura amb gran varietat d'arts i ormeigs, com són els tremalls i palangres de fons, nanses, al volantí, pesca amb arpó i arts d'arrossegament.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

Ordre: Perciformes

Família: Sparidae