

ESCAMARLÀ



Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)

Noms FAO: es cigala fr langoustine en norway lobster

Sin. compl.: gadagang

Codi FAO: NEP

Talla: màxima longitud 24 cm, comuna de 10 a 19 cm.



Diagnosi

Closca coberta de pèls curts i armada d'espines agudes, disposades en línies longitudinals, algunes disposades a les vores del solc cervical. Rostre bastant allargat. Vores laterals amb tres o quatre espines i la vora ventral amb una o dues dents. La cara superior dels segments abdominals amb solcs pubescents (pilosos) i llargs, interromputs sobre la línia mitjana i que s'estenen fins a les plaques laterals fortament desenvolupades (pleuron). Pinceres del primer parell de pereiòpodes fortes i allargades, armades d'espines disposades en files longitudinals. El segon i tercer parell de pereiòpodes molt més petits, però també amb pinceres. Color rosat amb taques entre vermelles i ataronjades, particularment visibles als dits de les pinceres i al segment que les precedeix (carpus). Ous d'un color verd intens.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal sobre fons fangosos o sorrencs, de 14 a 871 m de fondària (generalment de 100-300 m, però molt variable segons la regió) i ficant-se dins els amagatalls. Es reproduïx els mesos d'estiu, i les femelles són ovígeres (amb posta) fins al gener. S'alimenten de peixos, cucs, mol·luscs i petits crustacis.

Es troba a la Mediterrània Occidental, més rarament a l'oriental. També a l'Atlàntic, del Marroc a Noruega.

Pesca

De carn molt apreciada, té un volum de venda bastant elevat. Es pesca principalment a la primavera i l'estiu, a la sortida i posta de sol (a la plataforma continental) i de dia (al talús). Pesca semiindustrial i artesanal amb arts d'arrosegament i gàbies. Es troba regularment als mercats, i es comercialitza fresc, refrigerat o congelat.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 2 cm
longitud de cefalotòrax i 7 cm de longitud total.

Ordre: Decapoda (Reptantia)

Família: Nephropidae