



# OBLADA

*Oblada melanura* (Linnaeus, 1758)



**Noms FAO:** **es** oblada **fr** oblade **en** saddled seabream

**Sin. compl.:** beata\*, aurada\*, doblada, dobladeta\*, orada\*, virador

**Codi FAO:** SBS

Fórmula radial: D. XI + 13-14; A. III + 12-14

Talla: màxima 30 cm; comuna de 15 a 20 cm.

## Diagnosi

Cos oval i poc comprimit. Rostre curt. Escates sobre les galtes i part anterior del preopercle (el posterior està nu). Boca obliqua; a cada mandíbula, una filera externa de 8 a 10 incisius, seguits de petites dents còniques lleugerament corbades. Primer arc branquial amb 32 branquispines. Línia lateral amb 64-67 escates. Una sola aleta dorsal amb una part espinosa i l'altra de radis tous. L'anal amb tres espines i radis tous. Pectorals grans i una mica falcades. Les ventrals toràciques, amb una espina i cinc radis tous. Aleta caudal forcada. Coloració, general, grisencament argentada; dors més fosc amb irisacions blavoses; línies longitudinals, més o menys, aparents. Una taca gran, vorejada de blanc, sobre el peduncle caudal. Aletes clares. Regió ventral blanquinosa.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie demersal, viu a les aigües litorals sobre fons de roques i herbers de Posidònia fins als 40 m. L'alimentació és omnívora (algues, crustacis, mol·luscs i cucs). La reproducció del tipus hermafrodita proterogínica (primer femella i després mascle); l'època de fresa es dona d'abril a juny. S'estén arreu de la Mediterrània (rarament a la mar Negra). A l'Atlàntic Oriental, des del golf de Biscaia fins a Angola, incloses les illes Madeira, Canàries i de Cap Verd.

## Pesca

Espècie comercial de carn apreciada, en especial quan fa més de 20 cm. Es captura amb gran varietat d'arts i ormeigs com són els tremalls, nanses, al volanti, palangrons i arts d'arrossegament.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

**Ordre:** Perciformes

**Família:** Sparidae