



POP ROQUER

Octopus vulgaris Cuvier, 1797



Noms FAO: es pulpo común fr pieuvre en common octopus

Sin. compl.: pop ver, pop de roca*

Codi FAO: OCC

Talla: màxima longitud del mantell 23 cm, comuna de 10 a 20 cm.

Diagnosi

Mantell robust i musculós, de pell rugosa. Presenta quatre papil·les a la cara dorsal del mantell, una anterior, una posterior i dues laterals. Braços forts i bastant llargs, els laterals més llargs que els ventrals, i els dorsals els més curts (fórmula 3, 2, 4, 1). Braç III dret dels mascles ectocotilitzat, amb una lígula curta i en forma de cullera. De set a onze laminetes per hemibrànquia. Mascles amb dues fileres de grans ventoses als braços laterals. Pell amb un reticulat de fons, de color gris, groc o marró vermellós segons l'estat de l'individu. Quatre taques blanques, dues entre els ulls, dues sota la primera papil·la dorsal.

Comportament i distribució geogràfica

És una espècie bentònica i costanera, fins als 200 m de fondària, en fons rocosos i sorrencs. Són animals solitaris i territorials, que efectuen migracions estacionals poc importants relacionades amb la reproducció. El període de reproducció és de març a octubre. Els ous són petits i formes raïms. Les femelles els posen a les esquerdes de les roques i els cuiden fins que eclosionen. Juvenils planctònics durant un a tres mesos (segons la temperatura de l'aigua), abans d'esdevenir bentònics. S'alimenten de poliquets, crustacis, mol·luscs (també s'ha observat canibalisme) i peixos. Es troba a tot el Mediterrani. És una espècie cosmopolita d'aigües tropicals, subtropicals i temperades.

Pesca

Espècie molt abundant i de gran valor comercial. Pesca artesanal i com a preses accessòries a la pesca industrial i semiindustrial, amb arts d'arrossegament, nanses, poteres, catúfols, línies de mà, arts de platja, gàbies, tremall i en capbussada. Es troba regularment als mercats i es comercialitza fresc, refrigerat, congelat i sec.

NO ESTÀ REGULADA NI TÉ TALLA MÍNIMA LEGAL

Ordre: Octopoda

Família: Octopodidae