



# RAP VERMELL

*Lophius budegassa* Spinola, 1807



**Noms FAO:** es rape negro fr baudroie rousse en black-bellied angler

**Sin. compl.:** buldroi, rap, rap fotaire, rap negre

**Codi FAO:** ANK

Fórmula radial: 1D. III + III; 2D. 9-10; A. 8-9

Talla: màxima 100 cm; comuna de 20 a 40 cm.

## Diagnosi

Cos molt deprimit, ample a la regió anterior i aprimant-se ràpidament cap a la posterior. Pell nua, amb nombrosos apèndixs cutanis a la regió cefàlica. Línia lateral invisible. Cap fort, gros i aplanat. Boca immensa, amb la mandíbula inferior prominent i protractil com els maxil·lars. Dents fortes, còniques i, més o menys, articulades sobre les mandíbules i el paladar; dents faríngees. Obertura opercular reduïda a un orifici situat sota les pectorals. Dues aletes dorsal; la primera, formada per espines aïllades, no unides per cap membrana; de les tres primeres (cefàliques) dues són llargues i la tercera curta i totes es localitzen a la part més anterior del cap, a l'extrem de la primera, anomenada illicium, o filament pescador, amb un cimbell no bifurcat. Les tres darreres espines de la primera dorsal són més petites (occipitals) i sovint estan unides per una membrana. La segona dorsal i l'anal són oposades i estan formades per radis tous. Aletes ventrals petites i jugulars. Pectorals grans. Color marró vermellós, més o menys tacat. Pectorals orlades de negre. Peritoneu negre.

## Comportament i distribució geogràfica

Espècie de comportament bentònic, es troba damunt dels fons fangosos entre 25 i 830 m, però sobretot entre els 33 i 760 m. S'alimenta de peixos.

Es troba a tota la Mediterrània i a la mar Negra. A l'Atlàntic Oriental, des de les illes Britàniques fins al Senegal, incloent-hi les illes Canàries.

## Pesca

Es tracta d'una espècie molt valorada comercialment. Pesca semiindustrial i artesanal, principalment amb arts d'arrossegament (art de bou) i palangres de fons; també amb tremalls.

TALLA MÍNIMA LEGAL DE CAPTURA: 30 cm

**Ordre:** Lophiiformes

**Família:** Lophiidae